

FICHE D'INFORMATION

Journée mondiale sida 2011 – Rapport ONUSIDA

	2001	2005	2008	2009	2010
Personnes vivant avec le VIH	28.6 millions [26.7-30.9 millions]	31.0 millions [29.2-32.7 millions]	32.3 millions [30.4-33.8 millions]	32.9 millions [31.0-34.4 millions]	34 millions [31.6-35.2 millions]
Nouvelles infections à VIH	3.15 millions [2.96-3.33 millions]	2.81 millions [2.63-2.97 millions]	2.74 millions [2.52-2.93 millions]	2.72 millions [2.48-2.93 millions]	2.67 millions [2.46-2.90 millions]
Décès liés au sida	1.85 million [1.67-2.16 millions]	2.22 millions [2.07-2.48 millions]	2.04 millions [1.87-2.21 millions]	1.89 million [1.72-2.05 millions]	1.76 million [1.59-1.91 million]
Nouvelles infections parmi les enfants	550 000 [490 000-620 000]	540 000 [480 000-600 000]	460 000 [400 000-510 000]	430 000 [370 000-490 000]	390 000 [340 000-450 000]

L'épidémie dans le monde

- **34 millions [31,6 millions–35,2 millions] de personnes vivaient avec le VIH fin 2010**, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2001.
- **2,7 millions [2,4 millions–2,9 millions] de nouvelles infections** sont survenues dans le monde, soit 21 % de moins qu'en 1997, année où le nombre de nouvelles infections a atteint son pic.
- **1,8 million de personnes [1,6 million–1,9 million] sont décédées de causes liées au sida en 2010**, soit une baisse par rapport au pic de 2,2 millions [2,1 millions–2,5 millions] au milieu des années 2000.
 - L'ONUSIDA estime que **2,5 millions de décès ont été évités** dans les pays à revenu faible ou intermédiaire depuis 1995 grâce au traitement antirétroviral.
 - On estime que **700 000 décès liés au sida ont été évités pour la seule année 2010**.
- **Près de la moitié des personnes (47 %) pouvant prétendre à un traitement antirétroviral en bénéficie.**
 - Quelque **6,6 millions de personnes recevaient un traitement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire** fin 2010, sur les 14,2 millions de personnes pour qui il était indiqué.
 - Une **augmentation de 1,35 million par rapport à 2009**.

Femmes et enfants

- La proportion de **femmes vivant avec le VIH est restée stable – 50 % –** dans le monde ; les femmes sont davantage atteintes en Afrique subsaharienne (59 % de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH).
- En 2010, **48 % des femmes enceintes vivant avec le VIH ont reçu un traitement efficace** pour prévenir les nouvelles infections à VIH parmi les enfants.

- En 2010, près de **390 000 [340 000–450 000]** enfants sont nés séropositifs au VIH, ce qui représente une baisse par rapport au pic de 560 000 [500 000–630 000] atteint en 2002.
 - L'ONUSIDA estime que plus de **350 000 nouvelles infections à VIH parmi les enfants ont été évitées depuis 1995** en fournissant une prophylaxie antirétrovirale aux femmes enceintes vivant avec le VIH.
- **Le nombre de décès liés au sida chez les enfants de moins de 15 ans a diminué de 20 %** de 2005 à 2010.

Investissements

- Fin 2010, **USD 15 milliards étaient disponibles pour la riposte au sida.**
 - **Le montant de l'aide internationale a baissé**, passant de USD 7,6 milliards en 2009 à USD 6,9 milliards en 2010.
- En juin 2010, **les États Membres de l'ONU ont convenu d'un nouvel ensemble d'objectifs mondiaux, parmi lesquels dégager chaque année au moins USD 22-24 milliards** pour la riposte mondiale au sida à l'horizon 2015.

L'ONUSIDA a élaboré un nouveau cadre d'investissement dans la riposte au sida.

- Si le cadre est intégralement mis en œuvre,
 - **au moins 12,2 millions de nouvelles infections à VIH** pourront être évitées, dont 1,9 million parmi les enfants, entre 2011 et 2020, et
 - **7,4 millions de décès liés au sida** pourront être évités entre 2011 et 2020.

Statistiques régionales relatives au VIH – Année 2010

	Personnes vivant avec le VIH 2010	Nouvelles infections à VIH 2010	Décès liés au sida 2010	Prévalence du VIH chez les adultes (%)
Afrique subsaharienne	22,9 millions [21,6–24,1 millions]	1,9 million [1,7–2,1 millions]	1,2 million [1,1–1,4 million]	5 % [4,7 %–5,2 %]
Moyen-Orient et Afrique du Nord	470 000 [350 000–570 000]	59 000 [40 000–73 000]	35 000 [25 000–42 000]	0,2 % [0,2 %–0,3 %]
Asie du Sud et du Sud-Est	4,0 millions [3,6–4,5 millions]	270 000 [230 000–340 000]	250 000 [210 000–280 000]	0,3 % [0,3 %–0,3 %]
Asie de l'Est	790 000 [580 000–1,1 million]	88 000 [48 000–160 000]	56 000 [40 000–76 000]	0,1 % [0,1 %–0,1 %]
Océanie	54 000 [48 000–62 000]	3300 [2400–4200]	1600 [1200–2000]	0,3 % [0,2 %–0,3 %]
Amérique latine	1,5 million [1,2–1,7 million]	100 000 [73 000–140 000]	67 000 [45 000–95 000]	0,4 % [0,3 %–0,5 %]
Caraïbes	200 000 [170 000–220 000]	12 000 [9400–17 000]	9000 [6900–12 000]	0,9 % [0,8 %–1,0 %]
Europe orientale et Asie centrale	1,5 million [1,3–1,7 million]	160 000 [110 000–200 000]	90 000 [74 000–110 000]	0,9 % [0,8 %–1,1 %]
Europe centrale et occidentale	840 000 [770 000–930 000]	30 000 [22 000–39 000]	9900 [8900–11 000]	0,2 % [0,2 %–0,2 %]

	Personnes vivant avec le VIH 2010	Nouvelles infections à VIH 2010	Décès liés au sida 2010	Prévalence du VIH chez les adultes (%)
Amérique du Nord	1,3 million [1,0–1,9 million]	58 000 [24 000–130 000]	20 000 [16 000–27 000]	0,6 % [0,5 %–0,9 %]

Source : Journée mondiale sida 2011 – Rapport ONUSIDA

Contact

ONUSIDA | tél. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

ONUSIDA

L'ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui en matière de VIH. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org.